

IPRATROPIUMBROMID (Atrovent® 0,25 mg/ml)

Administrasjon / dosering

Inhalasjon med engangs forstøver.

Ipratropiumbromid (Atrovent®) kombineres med salbutamol (Ventoline®) såfremt det ikke er kontraindikasjoner (blandes i samme forstøver). Oksygenflow 6 - 8 liter/min. Total væskemengde i kammeret bør være 4-5 ml, fyll etter med NaCl 9 mg/ml hvis behov.

Dosering voksne og barn > 12 år

0,5 mg (2 ml), inhalasjon.

Dosering barn 6-12 år

0,25 mg (1 ml), inhalasjon.

Dosering barn 0-6 år

0,1 - 0,25 mg (0,4 - 1 ml), inhalasjon.

Behandlingen kan gjentas etter 5-15 min dersom manglende effekt.

Alltid konsultasjon ved behov for gjentatt dosering hos barn < 2 år.

Indikasjon

Alvorlig astma-anfall.

Forverring av KOLS.

Kontraindikasjon

- For pasienter med pulsfrekvens >120 (voksne) gis inhalasjon kun etter konferanse.

Forsiktighetsregler og bivirkninger

- Pasientens eget medikamentforbruk.
- Forstyrrelse i motilitet i mage-tarm kanalen (forstoppelse, diare, brekninger).
- Munntørrhet.
- Hodepine.
- Takykardi.
- Synsforstyrrelser.