

47. RETTS

- Infeksjon INA B99
- Feber R50.9
- Lokal infeksjon

Anbefalinger iht. RETTS

- Petekkier + infeksjonstegn som i oransje rute	U-stix
- Infeksjonstegn og sterk smerte - Feber > 38,5o og frostanfall nå eller før innkost - Immunsupprimert pasient - Feber > 38,5° + anamnese på innoperert materiale	U-stix
- Kraftig lokal infeksjon	U-stix + CRP
- Ingen av ovenstående symptomer/funn	

Fakta

Generalisert bakteriell infeksjon med påvirkede vitale parametere (**sepsis**) er potensielt livstruende. Sepsis kan utgå fra luftveier, urinveier, bukorgan, sår eller andre utgangspunkt. Tidlig diagnose og antibiotikabehandling kan være avgjørende for pasientens overlevelse! *Infeksjonstegn med sterk lokal **smerte*** kan være et tegn på invasiv streptokokk-infeksjon (**nekrotiserende fasciitt**), og er gitt høy prioritet (oransje) for legetilsyn. *Immunsuppresjon* (cytostatika eller kortisonbehandlet, evt. annen kjent immunsvikt) med infeksjonstegn gir høy risiko for å utvikle alvorlig infeksjon. *Petekkier* er betegnelsen på små punktformede blødninger i hud/slimhinner (for eksempel i munnhulen). De kan ha ulike årsaker. Etter hvor lenge de har stått, kan de være mer eller mindre røde, blå, lilla eller brune. *Innoperert materiale* som for eksempel ulike katetre innebærer alltid en økt risiko for alvorlig infeksjon.

Prosesstiltak prehospitalt: I henhold til lokale retningslinjer, prosedyrer og organisering

Prosesstiltak hospitalt: I henhold til lokale retningslinjer, prosedyrer og organisering

