

SALBUTAMOL (Ventoline® 1 mg/ml, 2 mg/ml)

Administrasjon / dosering

Inhalasjon med engangs forstøver.

Salbutamol (Ventoline®) kombineres med ipratropiumbromid (Atrovent®) såfremt det ikke er kontraindikasjoner (blandes i samme forstøver). Oksygenflow 6 - 8 liter/min. Total væskemengde i kammeret bør være 4-5 ml, fyll etter med NaCl 9 mg/ml hvis behov.

Dosering voksne og barn > 6 år
5 mg, inhalasjon.

Dosering barn 0-6 år
2,5 mg, inhalasjon.

Behandlingen kan gjentas etter 5-15 min dersom manglende effekt.

Alltid konsultasjon ved behov for gjentatt dosering hos barn < 2 år.

Se tabeller sykt barn.

Indikasjon

Alvorlig astma-anfall.
Forverring av KOLS.
Alvorlig allergisk reaksjon/anafylaksi med bronkospasme som ikke reagerer på adrenalin, konsulter.

Kontraindikasjon

- For pasienter med pulsfrekvens > 120 (voksne) gis inhalasjon kun etter konferanse.

Forsiktighetsregler og bivirkninger

- Pasientens eget medikamentforbruk.
- Hvis skjelving, dirrende fingrer, rask puls, hjertebank og uro kan pasienten være overdosert. Avbryt inhalasjonen.