

Revidert 27.09.22

STIKKSKADEPAKKE

/Eksponering for blodsmitte

- Veiledning for behandlende lege

INNHold:

HIV-positiv smittekilde:

Emtricitabine-Tenofovir : tabl. 200/245 mg

Isentress : tygge-tabl. 400 mg

Hepatitt-Bpositiv smittekilde:

Engerix-B: inj. 20 mcg/spr. 1ml

Hepatitis B immunoglobulin : inj 5 ml

DETTE GJØR DU SOM TAR I BRUK PAKKEN

1. Emtricitabin/Tenofovir, og Raltegravir (Isentress ®) – Skriv pasientens navn og legens navn på etiketten på legemiddeleska. Fyll ut vedlagt resept på preparatene og lever resepten til sykehusapoteket (ved leveranse utenom åpningstid skal postkassen ved inngangen til apoteket benyttes).

2. Engerix B og Hepatitis B Immunoglobulin - Fyll ut vedlagt resept på preparatene og lever resepten til sykehusapoteket (ved leveranse utenom åpningstid skal postkassen ved inngangen til apoteket benyttes).

3. Engerix B 3 doser - En ansatt på sykehuset følges opp av bedriftshelsetjeneste-trenger ikke å få utlevert denne resepten. I andre tilfeller leveres resepten til pasienten og det avklares hvem har ansvar å følge opp pasienten.

Posteksponeringsprofylakse HIV positiv smittekilde (Se vedlegg Posteksposisjonell profylakse for HIV smitte):

Vanligvis velges 2 nukleos(t)idanaloge revers transkriptasehemmere og 1 integrasehemmer:

Tenofovir/Emtricitabin 200/245 mg: 1 tbl x 1

+

Raltegravir (Isentress ®) 400 mg: 1 tbl x 2.

Behandlingstid: 4 uker

Dette regimet har rask virushemmende effekt og tolereres som regel godt. Obs interaksjon med jerntilskudd og med antacida som inneholder aluminium eller magnesium.